

Кальцикер Форте

Дієтична добавка

Суспензія кальцію з вітаміном D₃,
фосфором та підсолоджувачем

Листок-вкладиш
Інформація щодо застосування

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування Кальцикер Форте! Зберігайте цей листок-вкладиш, Вам може знадобитися перечитати його. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем чи фармацевтом.

Склад: молочний кальцій, фосфор, холекальциферол (вітамін D₃), підсолоджувач: розчин сорбітолу 70 %; зволожувач: гліцерин; емульгатор: пропіленгліколь, ксантанова камедь; ароматизатор ванілі; розчинник: кремнію діоксид колоїдний безводний; антиоксидант: кислота лимонна моногідрат; консервант: натрію бензоат; антиоксидант: кислота аскорбінова.

Компонент	На 5 мл (ml)	На 10 мл (ml)	Добова потреба для дітей з 3-х років	Добова потреба для дорослих
Молочного кальцію, з якого кальцію	1000 мг (mg)	2000 мг (mg)	-	-
	250 мг (mg)	500 мг (mg)	800 мг (mg)	1100-1200 мг (mg)
Фосфор	125 мг (mg)	250 мг (mg)	800 мг (mg)	1200 мг (mg)
Вітамін D₃ (холекальциферол)	5 мкг (mcg) 200 МО (IU)	10 мкг (mcg) 400 МО (IU)	10 мкг (mcg) 400 МО (IU)	5 мкг (mcg) 200 МО (IU)

Поживна (харчова) цінність на 100 г (g): білки 1,77 г (g), жири 0 г (g), вуглеводи 54,18 г (g).
Енергетична цінність (калорійність) на 100 г (g): 223,8 ккал (kcal) (936,38 кДж (kJ)).

Форма випуску: суспензія оральна з ванільним смаком.

Рекомендації щодо вживання: рекомендовано вживати дітям від 3-х років та дорослим як додаткове джерело до раціону харчування при дефіциті в організмі кальцію та вітаміну D₃, зумовленого неповноцінною дієтою, порушенням харчування, при підвищеній потребі організму. Може бути рекомендовано в період вагітності або годування груддю. Кальцій та фосфор беруть участь у формуванні кісткової тканини, згортанні крові, регулюванні процесів нервової провідності та м'язових скорочень, а також для підтримання стабільної нервової діяльності. **Не є лікарським засобом.**

Спосіб вживання та кількість: вживати внутрішньо безпосередньо перед прийомом їжі або під час їди. Перед застосуванням флакон добре струсити. Вживати дітям від 3-х років по 5 мл (ml) на добу, розділених на 2-3 прийоми; дорослим по 5 мл (ml) 2 рази на добу. Вагітним і жінкам в період лактації по 10 мл (ml) 2 рази на добу. Рекомендований курс становить 2 місяці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту; діти до 3-х років; захворювання та/або стани, що призводять до гіперкальціємії та/або гіперкальціурії; гіпервітаміноз D; гіперфосфатемія.

Застереження: вагітним та жінкам в період лактації вживати за призначенням лікаря.

Упаковка: по 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірною кришечкою у картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення. Номер серії виробництва та кінцева дата споживання «Термін придатності» вказані на упаковці. Після відкриття флакон зберігати з щільно закритою кришкою. Не слід використовувати після закінчення терміну придатності.
Без ГМО.

Виробник: Корал Лабораторіз Лтд.,
Плот №27-28, Фармасіті, Селакві, Дехрадун – 248 197, Уттаракханд, Індія.

Дистриб'ютор / Імпортер / Організація, яка приймає претензії: ТОВ «Конарк Інтелмед»,
вул. Шевченка, 315, м. Харків, 61033, Україна, тел.: +38 (044) 502-63-91.

Корисна інформація про компоненти

Кальцій. Зазвичай кальцій використовують як антацидний, противиразковий засіб та як джерело кальцію в дозі 1,5 г/добу, а також при гіперфосфатемії у людей з хронічною нирковою недостатністю в кількості 2,5–17 г на добу. Впливає на абсорбцію ліпопротеїдів у шлунково-кишковому тракті при одночасному прийомі. **Вітамін D₃.** Належить до похідних циклогексанометиленгідриндану. Практичне використання мають ергокальциферол (D₂) і холекальциферол (D₃). Перетворюються в організмі на гормоноподібну речовину, що бере участь у засвоєнні солей кальцію і фосфору, їх відкладенні в кістковій тканині. Недостатня кількість кальциферолів викликає порушення мінерального обміну. Зазвичай утворюється зі стеринів у шкірі людини під впливом УФ-променів. Джерелом вітаміну D₃ є жир печінки тунця, тріски та інших риб. Незначна його кількість міститься у вершковому маслі та яєчному жовтку, у рибіячому жирі. У рослинних продуктах він, як правило, зовсім відсутній.

Фосфор. Важливий мікроелемент в організмі людини. Фосфатний зв'язок поєднує послідовні нуклеотиди в нитках ДНК та РНК. АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) слугує головним енергетичним носієм клітин. Фосфоліпіди формують клітинні мембрани. Міцність кісток визначається наявністю у них фосфатів.

За матеріалами:

- Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, 2nd edition, vol. 3. New York, 2002. (Енциклопедія Фармацевтичних Технологій, 2 видання, том 3. Нью-Йорк, 2002).
- Корж А.А., Дєдух Н.В., Шевченко С.Д. Остеопороз: клініка, діагностика, профілактика та лікування // Харківський мед. журн. - 1997. - № 1. - С. 21-24.
- Чекман І.С. Біохімічна фармакодинамика. - Київ: Здоров'я, 1991. - 200 с.
- Brody T., Larner J., Minneman K. Human Pharmacology. Molecular to Clinic. — Mosby, 1998. — 1001 р. (Броді Т., Ларнер Джей., Мінеман К. Фармакологія людини. Від молекулярної до клініки – Мосбі, 1998. — 1001 с.).
- Salerno E. Pharmacology for Health professionals. — Mosby, 1999. — 827 р. (Салерно І. Фармакологія для медичних працівників. - Мосбі, 1999. - 827 с.).
- Handbook of Pharmaceutical Excipients / Edited by Raymond C. Rowe, Paul J. Shesky, Sain C. Owen — London Chicago, 2006. (Довідник про фармацевтичні допоміжні речовини / Під редакцією Раймонда С. Роу, Пол Дж. Шескі, Сейн К. Оуен - Лондон - Чикаго, 2006).
- Bone Health & Osteoporosis by Dr. Mark Percival CNI504 Rev. 11/99 Applied Nutritional Science reports. Copyright © 1997 Advanced Nutrition Publications, Inc., revised 1999. (Здоров'я кісток та остеопороз, доктор Марк Персівал CNI504 Пер. 11/99. Доповіді звітів Харчової Науки. Авторське право © 1997 Сучасні публікації про харчування, Інк., переглянуті 1999).
- Левітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія. — Х., 2000.
- Суховерхов В.В., Сенченко Г.Г., Ковтун Г.О., Приплавко С.О. Металовмісні лікарські препарати. — К., 2000.
- Боечко Ф.Ф., Боечко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993.
- Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін. Біологічна хімія. — Х., 2000.
- Машковский М.Д. Лікарські засоби. В 2 т. — Х., 1997. — Т. 2.
- Kirk R.E. Othmer D.F. Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. — New York, 1995, 4th ed. (Кірк Р.Е. Отмер Д.Ф. Енциклопедія фармацевтичних технологій. - Нью-Йорк, 1995 р., 4-е видання).

Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування.